

Der STIKO-Impfkalender

Erreger und ihre Wirkung

Rotaviren	Pneumokokken	Meningokokken	Windpocken	Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio, Hepatitis B, HIB (Sechsfach-Impfung)	Masern, Mumps, Röteln (Dreifach-Impfung)
verursachen Erbrechen und Durchfall.	können Lungen-, Mittelohr-, oder Hirnhautentzündungen hervorrufen.	können eine Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung verursachen	lösen Fieber und juckende Bläschen am ganzen Körper aus.	<p>Tetanus: Das Bakterium verursacht schwere Krämpfe und kann tödlich sein.</p> <p>Diphtherie: Der Erreger kann Organe schädigen und zum Erstickten führen.</p> <p>Keuchhusten: Lungen- und Mittelohrentzündungen</p> <p>Polio (Kinderlähmung): Kann zu einer dauerhaften Lähmung der Muskulatur führen.</p> <p>Hepatitis B: Die Erreger schädigen die Leber.</p> <p>HIB- Infektion: Im schlimmsten Fall führt die Infektion zu einer Hirnhaut- und Lungenentzündung.</p>	<p>Masern: Komplikationen sind Gehirnentzündungen.</p> <p>Mumps: Es drohen eine Hirnhautentzündung, oder Entzündungen der (Neben-) Hoden. Jungs können dadurch unfruchtbar werden.</p> <p>Röteln: Sie können ungeborene Babys schwer schädigen.</p>

Zeitpunkt laut STIKO-Impfkalender

<ol style="list-style-type: none"> 1. Impfung mit 6 Wochen 2. Impfung nach weiteren 4 Wochen. Ggf. eine 3. Impfung nach weiteren 4 Wochen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impfung mit 2 Monaten, 2. Impfung mit 4 Monaten, 3. Impfung im Alter von 11 – 14 Monaten. 	Einmalige Gabe des Impfstoffs gegen Meningokokken C, im Alter von 12 – 23 Monaten (von der STIKO nicht generell empfohlen).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impfung im Alter zwischen 11 und 14 Monaten, 2. Impfung 4 – 6 Wochen später. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impfung mit 6 Wochen, 2. Impfung mit 3 Monaten, 3. Impfung mit 4 Monaten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impfung mit 11 – 14 Monaten, 2. Impfung 4 Wochen danach, spätestens mit 23 Monaten.
---	--	---	--	--	---